



Дерматовенерология

Высшее образование

DOCX · PDF

Задач: 1

Вопросов: 12

Сформировано: 26.09.2026, 09:07 МСК · База обновлена: 12.09.2026, 02:44 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Ситуационная задача 0001

Образование: Высшее образование | Специальность: Дерматовенерология

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Девушка 25 лет обратилась на прием дерматовенеролога.

1.2. Жалобы

На появление высыпаний на коже туловища, задней поверхности шеи и верхних конечностей, сопровождающиеся интенсивным зудом.

1.3. Анамнез заболевания

Считает себя больной с 7 лет, когда впервые после употребления в пищу 250 мл цельного коровьего молока появились эритематозно-везикулёзные высыпания на коже щёк, эритематозно-папулёзные на коже туловища и конечностей. Обращалась к дерматологу. Назначались антигистаминные препараты и топические глюкокортикостероиды – с временным положительным эффектом. Кратность обострений заболевания составляла 1 раз в 2-3 года, преимущественно в зимне-осеннее время.

Следует отметить, что больная периодически применяла топические глюкокортикостероиды – с временным положительным эффектом. Три недели назад больная отмечала периодическое появление новых очагов лихенификации в области сгибательной поверхности локтевых суставов, задней поверхности шеи и туловища, сопровождавшихся интенсивным зудом. Самостоятельно применяла увлажняющие кремы и мази с глюкокортикостероидами – с незначительным положительным эффектом.

Настоящее обострение возникло неделю назад, когда после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) отметила появление эритемы, шелушения на коже туловища и верхних конечностей, а позже – распространенных везикулезных элементов, сопровождавшихся интенсивным зудом и повышением температуры до 38.1°C , в связи с чем обратилась к дерматологу для уточнения диагноза и дальнейшей тактики ведения.

1.4. Анамнез жизни

- * Хронический ринит (ремиссия).
- * Не курит.
- * Профессиональных вредностей не имеет.
- * Аллергическая реакция на клиндамицин в виде высыпаний и зуда.

1.5. Объективный статус

Состояние удовлетворительное. Вес 56 кг, рост 170 см. Температура тела 38.1°C .

Поражение кожи островоспалительного характера. Высыпания локализуются на коже задней поверхности шеи, туловища, тыльной поверхности кистей, сгибательной поверхности локтевых суставов, предплечий, плеч и представлены лихенифицированными очагами поражения, ярко-розового цвета, с резкими границами, плоской формы, неправильных очертаний и множественными мелкими сгруппированными везикулезными элементами с пупковидным вдавлением в центре, распространенными пустулами, шелушением и эксфолиациями на поверхности. Субъективно: беспокоит интенсивный зуд. SCORAD=30.



Объективный статус



Объективный статус

1. План обследования

Вопрос 1.

Для подтверждения диагноза необходимо исследовать уровень

1. ТТГ
2. общего IgE
3. прямого билирубина
4. холестерина

Правильный ответ:
2 - общего IgE

Одним из главных лабораторных исследований относят определение уровня общего IgE. Аллергены вызывают острые IgE-опосредованные тучно-клеточно зависимые обострения заболевания

Клинические рекомендации Минздрава России. Атопический дерматит, 2024 г.

(1)

Вопрос 2.

Для подтверждения диагноза необходимо дополнительно исследовать

1. патогистологическое исследование биоптата везикулезных очагов
2. специфический IgE к пищевым аллергенам
3. содержание IgA-антител к эндомизию крови
4. содержание IgA-антител к тканевой трансглутаминазе в крови

Правильный ответ:
2 - специфический IgE к пищевым аллергенам

У больной наблюдалась сенсibilизация к коровьему молоку, что говорит о необходимости исследования специфического IgE к пищевому аллергену. При данном заболевании необходимо исследовать уровень IgE к различным аллергенам (пищевым, бытовым, антигенам растительного, животного, химического происхождения)

Клинические рекомендации Минздрава России. Атопический дерматит, 2024 г.

(1)

2. Диагноз

Вопрос 3.

Наиболее вероятный диагноз для данной ситуации

1. Атопический дерматит, осложненный вторичной пиодермией
2. Хроническая экзема, осложненная герпесвирусной инфекцией
3. Простой герпес (диссеминированная форма), остиофолликулит
4. Атопический дерматит, осложненный герпетической экземой Капоши и вторичной пиодермией

Правильный ответ:
4 - Атопический дерматит, осложненный герпетической экземой Капоши и вторичной пиодермией

Критерии диагноза атопический дерматит:

Критерии герпетиформной экземы Капоши:

Критерии вторичной пиодермии:

Клинические данные: повышение температуры тела до 38.1°C , появление диссеминированных пустулезных элементов

Клинические рекомендации Минздрава России. Простой герпес (ПГ) у взрослых, 2025 г.

(1)

Атопический дерматит / С. В. Кошкин, М. Б. Дрождина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 112 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-5793-1.

(1)

Дерматовенерология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Ю. С. Бутова, Ю. К. Скрипкина, О. Л. Иванова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 896 с. - ISBN 978-5-9704-5708-5

(1)

Клинические рекомендации Минздрава России. Атопический дерматит, 2024 г.

(1)

(2)

Вопрос 4.

К главным диагностическим критериям атопического дерматита относят

1. складки на задней поверхности шеи
2. красный дермографизм
3. начало заболевания во взрослом возрасте
4. сезонность обострений

Правильный ответ:
4 - сезонность обострений

Согласно клиническим рекомендациям Дерматовенерология (2015 г.) к одному из главных диагностических критериев атопического дерматита относят сезонность обострений (ухудшение процесса в холодное время года и улучшение летом)

Клинические рекомендации Минздрава России. Атопический дерматит, 2024 г.

(1)

3. Лечение

Вопрос 5.

Дальнейшее обследование и лечение пациента должно проводиться в условиях _____ отделения

1. хирургического
2. терапевтического
3. амбулаторного
4. «дневного стационара»

Правильный ответ:
2 - терапевтического

Согласно условиям задачи, у больной отмечается атопический дерматит средней степени тяжести (SCORAD=30), осложненный герпетической экземой Капоши и вторичной пиодермией,

что требует лечения в стационарных условиях.

Клинические рекомендации Минздрава России. Атопический дерматит, 2024 г.

(1)

Вопрос 6.

В объеме системной терапии данной пациентке показано назначение

- ☒ 1. седативных антигистаминных препаратов
2. системных глюкокортикостероидов
3. циклоспорина
4. метотрексата

Правильный ответ:

1 - седативных антигистаминных препаратов

У больной отмечается среднетяжелая степень рецидивирующего атопического дерматита (SCORAD=30, интенсивный зуд)

Клинические рекомендации Минздрава России. Атопический дерматит, 2024 г.

(1)

Вопрос 7.

Для патогенетической терапии данной формы дерматита необходимо назначение

1. преднизолона 60 мг/сут
2. цефуроксима 750 мг в/м
- ☒ 3. ацикловира 1000 мг/сутки
4. бензилпенициллина натриевой соли 2000000 ЕД/сут в/м

Правильный ответ:

3 - ацикловира 1000 мг/сутки

У больной развилось осложнение – герпетическая экзема Капоши. Герпетическая экзема Капоши, или вариолиформный пустулез Юлиусберга – это осложнение хронических дерматозов, в данном случае атопического дерматита, спровоцированное вирусом простого герпеса.

Клинические рекомендации Минздрава России. Простой герпес (ПГ) у взрослых, 2025 г.

(1)

(2)

Вопрос 8.

Дифференциальный диагноз необходимо проводить с

1. истинной акантолитической пузырчаткой
- ☒ 2. рожистым воспалением
3. герпетиформным дерматитом Дюринга
4. аллергическим контактным дерматитом

Правильный ответ:

2 - рожистым воспалением

В отличие от ОГ рожа характеризуется более яркой гиперемией, большей отграниченностью отека от окружающей здоровой кожи, валикообразными, неровными краями.

(1)

Вопрос 9.

Топической терапией, которую необходимо назначить больной, является

- ① мазь Ацикловир, мази с антибиотиком
2. ингибиторы кальциневрина, мазь Ацикловир
3. топические ГКС мази, мазь Ацикловир
4. эмоленды, мазь Ацикловир

Правильный ответ:

1 - мазь Ацикловир, мази с антибиотиком

У больной наблюдаются клинические проявления герпесвирусной инфекции и пиодермии, что требует назначения мазей с антибиотиками и противовирусных топических препаратов.

Клинические рекомендации Минздрава России. Атопический дерматит, 2024 г.

(1)

Вопрос 10.

Применение топических глюкокортикостероидов противопоказано при

1. микробной экземе
2. системной склеродермии
- ③ вирусных инфекциях кожи
4. дискоидной красной волчанке

Правильный ответ:

3 - вирусных инфекциях кожи

Поскольку топические глюкокортикостероиды обладают выраженным иммуносупрессивным действием, топические глюкокортикостероиды противопоказаны при лечении вирусных инфекций кожи.

Клинические рекомендации Минздрава России. Простой герпес (ПГ) у взрослых, 2016 г.

(1)

4. Вариатив

Вопрос 11.

Использование топических глюкокортикостероидов высокой активности в течение длительного времени при беременности может привести к

1. подавлению функции щитовидной железы
- ② внутриутробной задержке роста плода
3. тератогенному эффекту
4. увеличению уровня андренокортикотропного гормона у плода

Правильный ответ:

2 - внутриутробной задержке роста плода

Согласно клиническим рекомендациям по Дерматовенерологии (2015 г.) длительное применение топических глюкокортикостероидов может привести к внутриутробной задержке

роста плода.

Клинические рекомендации Минздрава России. Простой герпес (ПГ) у взрослых, 2016 г.
(1)

Вопрос 12.

Пимекролимус можно назначать детям с возраста

1. двух лет
2. двух месяцев
3. трех месяцев
4. одного месяца

Правильный ответ:
3 - трех месяцев

Согласно клиническим рекомендациям пимекролимус необходимо назначать с трех месяцев.
Клинические рекомендации Минздрава России. Атопический дерматит, 2024 г.
(1)