



Функциональная диагностика

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 06:25 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 06:23 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

КОРНЕЛЬСКИЙ ВОЛЬТАЖНЫЙ ИНДЕКС (RAVL + SV3) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У МУЖЧИН ПРИ ЗНАЧЕНИИ БОЛЬШЕ (В ММ)

1. 25
- 2. 28**
3. 18
4. 20

Правильный ответ: 2 - 28

Вопрос 2

ИМПЛАНТИРУЕМЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКГ РЕГИСТРАЦИИ (ПЕТЛЕВЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ) СПОСОБНЫ ПРОВОДИТЬ ЗАПИСЬ РИТМА СЕРДЦА ДО

1. 3 месяцев
- 2. 12 месяцев**
3. 30 дней
4. 7 дней

Правильный ответ: 2 - 12 месяцев

Вопрос 3

РЕТИКУЛЯРНЫЕ ВАРИКОЗНЫЕ ВЕНЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ РАСШИРЕННЫЕ ИЗВИТЫЕ ПОДКОЖНЫЕ ВЕНЫ ДИАМЕТРОМ (В МИЛЛИМЕТРАХ)

1. менее 1
2. 3,5-5
- 3. 1-3**
4. более 5

Правильный ответ: 3 - 1-3

Вопрос 4

ДОСТОВЕРНЫМ КРИТЕРИЕМ ИШЕМИИ МИОКАРДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОБЫ СЧИТАЕТСЯ

1. инверсия зубца Т на 2 ступени нагрузочной пробы
- 2. депрессия сегмента ST на 2 мм и более**
3. элевация на электрокардиограмме сегмента ST на 0,5 мм
4. снижение точки «j» более, чем на 2 мм на электрокардиограмме

Правильный ответ: 2 - депрессия сегмента ST на 2 мм и более

Вопрос 5

ИНФОРМАЦИЮ, СОСТАВЛЯЮЩУЮ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ПО ЗАПРОСУ

- 1. военных комиссариатов в целях проведения военно-врачебной экспертизы**
2. образовательных организаций в целях использования в учебном процессе

3. адвокатских коллегий в целях защиты прав пациента
4. научных организаций в целях проведения научных исследований и опубликования их результатов

Правильный ответ: 1 - военных комиссариатов в целях проведения военно-врачебной экспертизы

Вопрос 6

ОТНОШЕНИЕ ШИРИНЫ АОРТАЛЬНОЙ РЕГУРГИТАЦИИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ, $\geq$ III СТЕПЕНИ, К ДИАМЕТРУ ВЫВОДНОГО ТРАКТА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

1. более 65
2. 25-35
3. менее 25
4. 36-64

Правильный ответ: 1 - более 65

Вопрос 7

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЗАПИСЬ

1. функциональных шумов сердца
2. электрических потенциалов сердца
3. ультразвуковых волн
4. тонов сердца

Правильный ответ: 2 - электрических потенциалов сердца

Вопрос 8

К ХАРАКТЕРНЫМ ЭКГ-ПРИЗНАКАМ ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА ОТНОСЯТ

1. глубокие зубцы Q
2. горизонтальную депрессию S-T
3. зубцы QS
4. депрессию S-T выпуклостью кверху и несимметричный зубец T

Правильный ответ: 4 - депрессию S-T выпуклостью кверху и несимметричный зубец T

Вопрос 9

ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ РЕЦИПРОКНОЙ АТРИО-ВЕНТРИКУЛЯРНОЙ УЗЛОВОЙ ТАХИКАРДИИ НЕОБХОДИМО

1. aberrantное проведение на желудочки
2. повышение автоматизма клеток проводящей системы сердца – эктопических центров II и III порядка
3. наличие условий для циркуляции импульса в АВ-узле
4. повышение автоматической активности АВ-соединения

Правильный ответ: 3 - наличие условий для циркуляции импульса в АВ-узле

Вопрос 10

ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ВЕРХНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1. опухоль верхушки легкого
- 2. варикозное расширение медиальной подкожной вены
- 3. острый тромбоз подмышечной вены
- 4. острый тромбоз подключичной вены

Правильный ответ: 1 - опухоль верхушки легкого