



Медицинская психология

Высшее образование

DOCX · PDF

Задач: 1

Вопросов: 12

Сформировано: 26.09.2026, 06:49 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 06:46 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Ситуационная задача 0001

Образование: Высшее образование | Специальность: Медицинская психология

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Мужчина 55 лет, направлен на клинико-психологическое обследование к медицинскому психологу врачом-пульмонологом для выявления особенностей патологического отношения к болезни и определения мишеней психологической помощи.

1.2. Жалобы

Жалоб на момент обследования не предъявляет. Высказывает недоумение в отношении причин лечения у пульмонолога. При целенаправленном расспросе сообщает о наличии кашля, физических ограничений и слабости, связанных с одышкой при физической нагрузке, с большим трудом поднимается по лестнице.

1.3. Анамнез заболевания

Проявления хронической обструктивной болезни легких манифестировали в 45 лет, когда появился кашель с мокротой, особенно выраженный в ранние утренние часы. Пациент не видел в нём признаков какой-либо серьёзной соматической патологии. На протяжении последующих лет кашель постепенно усиливался, появилась и нарастала одышка при физической нагрузке. Отмечая постепенно нараставшую физическую утомляемость, пациент всё с большим трудом выполнял профессиональные обязанности, был вынужден сократить число рабочих смен. Больным при этом себя не считал, легочные симптомы расценивал как признаки естественного старения. Несмотря на рекомендации пульмонолога, продолжал курить. Игнорируя врачебные рекомендации, время от времени устраивал себе проверки физического состояния в виде пробежек, быстрого подъёма по лестнице, многократных отжиманий от пола.

1.4. Анамнез жизни

По характеру в течение жизни был возбудимым и вспыльчивым. Не скрывал многочисленные конфликты и драки, в которые ввязывался в течение жизни, будучи убеждённым в своей правоте. Употреблял алкоголь в компании приятелей. Считал курение неотъемлемой частью своей жизни, никогда не пытался отказаться от этой привычки. В течение жизни своим здоровьем не интересовался. В случае недомогания к врачам не обращался, простудные явления переносил на ногах, пренебрегал профилактическими медицинскими осмотрами.

1.5. Объективный статус

Заключение пульмонолога: хроническая обструктивная болезнь легких среднетяжелого течения вне обострения.

1. Диагностика

Вопрос 1.

Патологическое гипонозогнозическое отношение к заболеванию характеризуется

1. снижением социальной и физической активности
2. отрицанием болезни
3. фиксацией на телесных ощущениях
4. уходом в болезнь

Правильный ответ:
2 - отрицанием болезни

Терапия и реабилитация пациентов значительно осложняются при формировании патологического отношения к болезни, которое может быть представлено в двух полярных

вариантах: гипернозогнозического с уходом в болезнь; гипонозогнозического с отрицанием болезни.

Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов.- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1008 с. - ISBN9785970444627

(1)

Вопрос 2.

В связи с хронической гипоксией в рамках клинико-психологического обследования пациента с хронической обструктивной болезнью легких может выявляться

1. измененность мотивационного компонента психической деятельности
2. снижение ориентированности на социальный контекст ситуации
3. преобладание примитивных защитных механизмов
4. расстройство когнитивных функций

Правильный ответ:

4 - расстройство когнитивных функций

Хроническая гипоксия приводит к развитию расстройств настроения и когнитивных функций, которые в свою очередь могут привести к аффективной лабильности, снижению дневной активности.

Психиатрия : национальное руководство / гл. ред. : Ю. А. Александровский, Н. Г. Незнанов.- Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 1008 с. - ISBN9785970444627

(1)

Вопрос 3.

К проявлениям аберрантной ипохондрии у пациентов с соматическим заболеванием относится

1. пренебрежение заботой о здоровье
2. внимание к неприятным телесным ощущениям
3. сбор дополнительной информации о лечении
4. щадящее отношение к себе с избеганием нагрузок

Правильный ответ:

1 - пренебрежение заботой о здоровье

По данным психологического обследования пациентов с хронической обструктивной болезнью легких с аберрантной ипохондрией в большинстве случаев отличает эгодистонное отношение к телу (тело воспринимается как чужое, «далекое», отстраненное): пациенты слабо ориентируются в телесных ощущениях, пренебрегают заботой о здоровье (курение, злоупотребление алкоголем), а также ради достижения поставленных целей не берегут себя на работе, пренебрегают техникой безопасности.

Респираторная медицина: руководство: в 3 т. / под ред. А. Г. Чучалина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Литтерра, 2017. — Т. 3. — 464 с.

(1)

Вопрос 4.

В противодействии хроническому заболеванию пассивная стратегия поведения характеризуется

1. реакциями преуменьшения серьезности болезни

2. уменьшением социальных контактов и сужением сферы общения
3. снижением интенсивности профессиональных нагрузок
4. ограничительным поведением с избеганием выхода из дома

Правильный ответ:

1 - реакциями преуменьшения серьезности болезни

В противодействии хроническому заболеванию существуют две стратегии поведения — пассивная и активная. К пассивному поведению относятся защитные механизмы: реакции преуменьшения серьезности болезни типа игнорирования, самообмана, рационализации или сверхконтроля. Однако ценность этих пассивных попыток преодоления психологических и социальных следствий при длительной болезни часто сомнительна.

Психотерапевтическая энциклопедия / под ред. Карвасарского Б.Д.; 2-е изд. — СПб.: Питер, 2002. - 1024 с. - (Золотой фонд психотерапии)

(1)

Вопрос 5.

В качестве особенностей эмоциональных реакций при гипонозогнозическом отношении к хронической обструктивной болезни легких у пациентов наблюдается их

1. искажение
2. снижение
3. усиление
4. выхолащивание

Правильный ответ:

2 - снижение

У больных хронической обструктивной болезнью легких и бронхиальной астмой с явлениями аберрантной ипохондрии (гипонозогнозии) регистрируется снижение эмоциональной реакции на возникшую легочную патологию, а также ассоциированных с респираторной болезнью расстройств.

Респираторная медицина: руководство: в 3 т. / под ред. А. Г. Чучалина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Литтерра, 2017. — Т. 3. — 464 с.

(1)

Вопрос 6.

При гипонозогнозическом отношении к хронической обструктивной болезни легких пациенты склонны объяснять возникшие симптомы

1. возрастными изменениями
2. перенесенными ранее в жизни респираторными заболеваниями
3. повреждениями травматической природы
4. профессиональными вредностями

Правильный ответ:

1 - возрастными изменениями

При аберрантной ипохондрии (гипонозогнозии) у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких отчетливых представлений о недуге, соответственно, коррекции поведения не формируется. Больные не осознают серьезность заболевания, списывая возникшие симптомы на «возрастные изменения», не допускают мысли о возможном прогрессировании недуга, развитии дыхательной недостаточности — продолжают курить, остаются на вредном производстве.

Респираторная медицина: руководство: в 3 т. / под ред. А. Г. Чучалина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Литтерра, 2017. — Т. 3. — 464 с.

(1)

2. Психологическая помощь

Вопрос 7.

Немедикаментозное вмешательство при хронической обструктивной болезни легких зачастую направлено на

1. ограничение физических нагрузок
2. снижение чувствительности к телесным ощущениям и тревоги о здоровье
3. изменение эмоционального уровня внутренней картины болезни
4. отказ от курения

Правильный ответ:
4 - отказ от курения

К традиционным немедикаментозным вмешательствам при хронической обструктивной болезни легких относят отказ от курения, программы физической реабилитации.

Клинические рекомендации Минздрава России. Хроническая обструктивная болезнь легких, 2024 г.

(1)

(2)

Вопрос 8.

Формирование комплаентности к лечению основного заболевания в рамках клинико-психологической помощи пациентам с гипонозогнозическим отношением к хронической обструктивной болезни легких затруднено в связи с

1. особенностями отношения в социуме к данному соматическому заболеванию
2. ограниченностью энергетических ресурсов психической деятельности
3. незаинтересованностью в информации о заболевании
4. восприятием заболевания как представляющего угрозу жизни

Правильный ответ:
3 - незаинтересованностью в информации о заболевании

Несмотря на объективную тяжесть соматических проявлений (одышка вплоть до удушья, кашель, снижение толерантности к физическим нагрузкам), пациенты с хронической обструктивной болезнью легких при аберрантной ипохондрии (гипонозогнозии) не заинтересованы в получении информации о своем заболевании.

Респираторная медицина: руководство: в 3 т. / под ред. А. Г. Чучалина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Литтерра, 2017. — Т. 3. — 464 с.

(1)

Вопрос 9.

При оказании клинико-психологической помощи пациенту с соматическим заболеванием необходимо прояснение условий

1. раннего развития этого индивида
2. оказания медицинской помощи

3 жизни, влияющих на течение болезни

4. доступа к психообразовательным программам

Правильный ответ:

3 - жизни, влияющих на течение болезни

Психотерапевт должен уметь объяснять больному возможные неудачи лечения или прояснять условия жизни, влияющие на течение болезни, когда, например, пациент с помощью близких успешно справляется с новой обстановкой или когда, наоборот, семья мешает больному сосредоточить усилия на борьбе с болезнью.

Психотерапевтическая энциклопедия / под ред. Карвасарского Б.Д.; 2-е изд. -- СПб.: Питер, 2002. - 1024 с. - (Золотой фонд психотерапии)

(1)

Вопрос 10.

Изменению отстраненного отношения к телу при аберрантной ипохондрии пациентов с хронической обструктивной болезнью легких может способствовать развитие ориентировки в

1. реабилитационных мероприятиях

2. данных инструментальных и лабораторных обследований

3 телесных ощущениях

4. медикаментозных врачебных назначений

Правильный ответ:

3 - телесных ощущениях

По данным психологического обследования пациентов с хронической обструктивной болезнью легких с аберрантной ипохондрией в большинстве случаев отличает эгодистонное отношение к телу (тело воспринимается как чужое, «далекое», отстраненное): пациенты слабо ориентируются в телесных ощущениях, пренебрегают заботой о здоровье (курение, злоупотребление алкоголем), а также ради достижения поставленных целей не берегут себя на работе, пренебрегают техникой безопасности.

Респираторная медицина: руководство: в 3 т. / под ред. А. Г. Чучалина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Литтерра, 2017.

(1)

3. Вариатив

Вопрос 11.

Психологически дезорганизующим фактором в основе психогенных психических расстройств в ситуации соматического заболевания является

1. обширность репертуара стратегий совладающего поведения

2. разрешение межличностных конфликтов

3. ухудшение социальных условий жизни пациента

4 патологическая внутренняя картина болезни

Правильный ответ:

4 - патологическая внутренняя картина болезни

Патологическая внутренняя картина болезни - это тот психологически дезорганизующий фактор, который лежит в основе формирования психогенных психических расстройств [при соматических заболеваниях].

Психиатрия. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Н. Краснова, Н. Г. Незнанова, В. Я. Семке, А. С. Тиганова; отв. ред. Ю. А. Александровский. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 624 с. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-6175-4

(1)

Вопрос 12.

Психотерапия при соматических заболеваниях связана с _____ эффективности лечебных воздействий биологического характера

1. исследованием
2. повышением
3. снижением
4. искажением

Правильный ответ:
2 - повышением

Направленная на восстановление тех элементов системы отношений пациента, которые определяют возникновение участвующего в этиопатогенезе заболевания психического стресса либо развитие в связи с последним невротических «наслоений», психотерапия способствует уменьшению клинических проявлений заболевания, повышению социальной активации больных, их адаптации в семье и обществе, а также повышает эффективность лечебных воздействий биологического характера.

Психотерапевтическая энциклопедия / под ред. Карвасарского Б.Д.; 2-е изд. -- СПб.: Питер, 2002. - 1024 с. - (Золотой фонд психотерапии)

(1)