



Нефрология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 03:50 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 03:46 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

СИМПТОМЫ ИНТОКСИКАЦИИ, БОЛИ В ЖИВОТЕ И ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СИМПТОМ ПАСТЕРНАЦКОГО У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА НАБЛЮДАЮТ ПРИ

1. вульвовагините
2. цистите
3. дисметаболической нефропатии
4. пиелонефрите

Правильный ответ: 4 - пиелонефрите

Вопрос 2

О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЖЕЛЕЗА ГОВОРIT ДОЛЯ ГИПОХРОМНЫХ ЭРИТРОЦИТОВ БОЛЕЕ (В ПРОЦЕНТАХ)

1. 20
2. 25
3. 15
4. 10

Правильный ответ: 4 - 10

Вопрос 3

У ПАЦИЕНТА С ОСТРОЙ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ ОДНИМ ИЗ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ЯВЛЯЮТСЯ

1. антитела к гистонам
2. анти-Sm антитела
3. анти-scl-70 антитела
4. анти-Ro антитела

Правильный ответ: 2 - анти-Sm антитела

Вопрос 4

ИНИЦИАЛЬНАЯ ГЕМАТУРИЯ ВОЗНИКАЕТ ПРИ

1. нефрите
2. простатите
3. уретрите
4. цистите

Правильный ответ: 3 - уретрите

Вопрос 5

НАРУШЕНИЕ СОСТАВА КОЛЛАГЕНА БАЗАЛЬНЫХ МЕМБРАН ИМЕЕТ МЕСТО ПРИ

1. острым пиелонефрите
2. липоидном нефрозе
3. подагрической почке

④ синдроме Альпорта

Правильный ответ: 4 - синдроме Альпорта

Вопрос 6

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК РАЗВИТИЕ АНЕМИИ ОБУСЛОВЛЕНО

- ① снижением синтеза эритропоэтина почками
- 2. снижением уровня ферритина
- 3. нарушением всасывания железа в кишечнике
- 4. снижением уровня трансферрина

Правильный ответ: 1 - снижением синтеза эритропоэтина почками

Вопрос 7

ПРИЧИНОЙ ПРЕРЕНАЛЬНОГО ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК ВЫСТУПАЕТ

- 1. острый интерстициальный нефрит
- 2. обтурация мочеточников
- 3. острый гломерулонефрит
- ④ сердечная недостаточность

Правильный ответ: 4 - сердечная недостаточность

Вопрос 8

УРАТАМИ НАЗЫВАЮТ СОЛИ _____ КИСЛОТЫ

- 1. щавелевой
- 2. фосфорной
- 3. янтарной
- ④ мочевой

Правильный ответ: 4 - мочевой

Вопрос 9

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПОДДЕРЖИВАЮЩУЮ ТЕРАПИЮ КОРТИКОСТЕРОИДАМ И АЗАТИОПРИНОМ, РЕКОМЕНДОВАНО

- ① продолжить прием препаратов в подобранной дозе, не снижать дозы этих препаратов в период беременности и продолжить лечение как минимум в течение 3 месяцев после родоразрешения
- 2. отменить терапию кортикостероидами
- 3. отменить терапию азатиоприном
- 4. азатиоприн заменить на мофетил-микофеналат, проводить данную терапию в течение всей беременности и продолжить лечение в течение 1 месяца после родоразрешения

Правильный ответ: 1 - продолжить прием препаратов в подобранной дозе, не снижать дозы этих препаратов в период беременности и продолжить лечение как минимум в течение 3 месяцев после родоразрешения

Вопрос 10

КЛИНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ, ТРЕБУЮЩЕЙ ОСТОРОЖНОСТИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИН-ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА , ЯВЛЯЕТСЯ

1. комбинация с бета-адреноблокаторами
2. переливание свежезамороженной плазмы
3. бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов
4. комбинация с блокаторами кальциевых каналов и калийсберегающими диуретиками

Правильный ответ: 3 - бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов