



Пластическая хирургия

Высшее образование

DOCX · PDF

Задач: 1

Вопросов: 12

Сформировано: 26.09.2026, 04:33 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 04:27 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Ситуационная задача 0001

Образование: Высшее образование | Специальность: Пластическая хирургия

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Женщина 29 лет на первичном приеме у пластического хирурга.

1.2. Жалобы

На неудовлетворительную форму и провисание, большой объем и асимметрию молочных желез, боли в грудном отделе позвоночника, перетяжки от лямок бюстгалтера, повышенную потливость в области подгрудных складок, эстетический дискомфорт.

1.3. Анамнез заболевания

Молочные железы начали постепенно увеличиваться с начала периода пубертата, формировались больших размеров, однако, это не беспокоило пациентку, поскольку по материнской линии в семье у всех женщин наблюдались молочные железы больших размеров.

Во время беременности отметила резкое увеличение молочных желез. К концу беременности в 2012 г. железы еще больше увеличились и опустились до уровня пупка. Родоразрешение кесаревым сечением. После родов со слов пациентки, молочные железы достигли уровня паха, имела место выраженная отечность нижних отделов желез с периодической мацерацией кожного покрова. В связи с выраженными сложностями при сцеживании молока, возник тотальный лактозастаз с риском развития некрозов молочных желез. В связи с этим было принято решение о медикаментозном подавлении лактации. Назначен препарат Достинекс, лактация подавлена в течение недели. Далее в течение 2—3 мес. молочные железы несколько уменьшились в объеме, но кожные покровы не сократились.

1.4. Анамнез жизни

Росла и развивалась нормально

В анамнезе:

- * детские и респираторные инфекции;
- * 2002 и 2005 гг. — прерывание беременности;
- * 2002 г. — удаление липомы правого плеча;
- * наследственность не отягощена;
- * отмечает большие размеры молочных желез у бабушки по материнской линии;
- * онкологический семейный анамнез по материнской линии по раку молочных желез отрицает

1.5. Объективный статус

При поступлении рост 170 см, масса тела 64 кг, ИМТ — 20,1 кг/м², дыхательная, сердечно-сосудистая системы, органы пищеварения без особенностей. Гемодинамика стабильна. Психо-эмоционально - стабильна

1. План обследования

Вопрос 1.

Необходимыми для постановки диагноза клиническими и лабораторными методами обследования являются

1. определение генов BRCA-2
2. определение гормонального статуса пациента

3 осмотр

4. определение генов BRCA-1

5 пальпация

6. онкомаркеры CEA, CA 19-9, CA 125, CA 15-3

Правильные ответы:

2 - определение гормонального статуса пациента

3 - осмотр

5 - пальпация

Гусейнов А.З., Истомин Д.А., Гусейнов Т.А. Основы маммологии: монография. Санкт-Петербург-Тула: Издательство ТулГУ, 2014, 258 с. (с.80)

Эстроген-гестагенные нарушения играют определяющую роль в регуляции морфологических и гистологических изменений в тканях МЖ. Наиболее важную роль в физиологии МЖ играет эстрадиол. Он отвечает за большинство морфологических изменений, обуславливающих разницу тканей МЖ мужчины и женщины, и воздействует на клетки МЖ независимо от пола и возраста. Его концентрация в соединительной ткани МЖ в 2-20 раз выше, чем в плазме крови. Эстрадиол стимулирует дифференцировку и развитие эпителия протоков МЖ, усиливает синтез ДНК и митотическую активность эпителия. При высоких концентрациях эстрадиол индуцирует формирование ацинуса. В концентрациях, соответствующих фолликулярной фазе менструального цикла, эстрадиол способствует развитию МЖ. Он стимулирует васкуляризацию и степень гидратации соединительной ткани, поэтому нарушение гормонального баланса вызывает отек и гипертрофию интралобулярной соединительной ткани, содержащей большое количество фибробластов и коллагеновых волокон.

Методические рекомендации по профилактике рака молочной железы. ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.И. КУЛАКОВА» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

Институт онкогинекологии и маммологии

Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы», 2018 год, стр 11

Лабораторные методы исследования

Гормональные исследования (пролактин, эстрадиол, ФСГ, ЛГ, прогестерон, ТТГ, Т3, Т4).
Определение гормонального статуса является обязательным компонентом в комплексном обследовании женщин с заболеваниями молочных желез с целью правильного выбора лечебной тактики.

После сбора жалоб и анамнеза необходимо провести осмотр и объективную оценку состояния и положения молочных желез, симметрию

Соколов И.С., Пшениснов К.П. «Протоколы подготовки и обеспечения основных эстетических операций». Избранные вопросы пластической хирургии. – Издательство «Аверс Плюс» г. Ярославль. – Издание под патронажем РНИМУ им. Н.И.Пирогова (Москва) и Ярославского государственного медицинского университета. - том 2 №2, 2018. – 40 стр

* Операции в области молочных желез. Увеличение молочных желез, редукция, подтяжка.
Первичная консультация – стр 20.

* УЗИ молочной железы (Если имеются изменения – дополнительно консультация онколога-маммолога)

* Сбор анамнеза (наличие родов и кормление грудью, изменение формы молочной железы с течением времени)

* Осмотр, определение параметров, плотности и эластичности тканей, симметрии и деформации, степени птоза

Пальпация позволяет оценить состояние кожных покровов, тургор, эластичность, консистенцию молочных желез, состояние лимфатических коллекторов

Соколов И.С., Пшениснов К.П. «Протоколы подготовки и обеспечения основных эстетических операций». Избранные вопросы пластической хирургии. – Издательство «Аверс Плюс» г. Ярославль. – Издание под патронажем РНИМУ им. Н.И.Пирогова (Москва) и Ярославского государственного медицинского университета. - том 2 №2, 2018. – 40 стр.

Операции в области молочных желез. Увеличение молочных желез, редукция, подтяжка. Первичная консультация – стр 20.

* УЗИ молочной железы (Если имеются изменения – дополнительно консультация онколога-маммолога)

* Сбор анамнеза (наличие родов и кормление грудью, изменение формы молочной железы с течением времени)

* Осмотр, определение параметров, плотности и эластичности тканей, симметрии и деформации, степени птоза

Вопрос 2.

Необходимыми для постановки диагноза и подготовки к вмешательству инструментальными методами обследования являются

1. радиотермометрия
2. дуктография
3. МРТ молочных желез
4. термометрия
5. ультразвуковое исследование молочных желез
6. МРТ головного мозга

Правильные ответы:

5 - ультразвуковое исследование молочных желез

6 - МРТ головного мозга

Ультразвуковое исследование молочных желез. Шаг за шагом. От простого к сложному / А.Н.Сенча – М.: МЕДпресс-ин форм, 2018. – 184 с. : ил. (стр.15)

Этапная хирургическая коррекция гигантомастии. Методические рекомендации

К.м.н. а.а. Копылов, д.м.н. Б.ш. Гогия, д.б.н. И.а. Чекмарева, д.м.н. О.В. Паклина, к.м.н. Р.Р. Аляутдинов, к.м.н. Н.О. Султанова, к.м.н. Т.В. Токарева, к.м.н. А.Н. Лебедева, к.м.н. И.П. Колганова ФГБУ «Институт хирургии им. а.В. Вишневского» (дир. — акад. РАН а.ш. Ревшвили) Минздрава РФ, Москва, Россия (с. 77)

В процессе выполнения УЗИ МЖ оцениваются:

1. МЖ в целом:

- расположение, симметричность;
- экзогенность;
- экоструктура, соотношение жировой, железистой тканей; Для детализации истинной и ложной гипертрофии молочных желез.
- состояние млечных протоков;
- область соска и ареолы;
- кровеносные сосуды паренхимы (интенсивность, симметричность).

2. Изменения в МЖ:

- характер изменений (диффузные, очаговые);

_Соколов И.С., Пшениснов К.П. «Протоколы подготовки и обеспечения основных эстетических операций». Избранные вопросы пластической хирургии. – Издательство «Аверс Плюс» г.

Ярославль. – Издание под патронажем РНИМУ им. Н.И.Пирогова (Москва) и Ярославского государственного медицинского университета. - том 2 №2, 2018. – 40 стр._

Операции в области молочных желез. Увеличение молочных желез, редукция, подтяжка. Первичная консультация – стр. 20.

* УЗИ молочной железы (Если имеются изменения – дополнительно консультация онколога-маммолога)

* Сбор анамнеза (наличие родов и кормление грудью, изменение формы молочной железы с течением времени)

* Осмотр, определение параметров, плотности и эластичности тканей, симметрии и деформации, степени птоза

Федеральные клинические рекомендации по гиперпролактинемии: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и методы лечения. Российская ассоциация эндокринологов. ФГБУ Эндокринологический научный центр Минздрава России, 2015 год.

Клинические рекомендации по гиперпролактинемии: клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и методы лечения. Российская ассоциация эндокринологов, 2014

Визуализирующие методы в диагностике пролактином. Стр. 8

МРТ головного мозга является наиболее информативным методом в диагностике опухолей гипоталамо-гипофизарной области (уровень доказательности 1, класс рекомендаций А)

Вопрос 3.

Ультразвуковое исследование молочных желез следует провести в сроки _____ день менструального цикла

1. 20-28 (30)
2. 14-18
3. 5-12
4. 1-4

Правильный ответ:

3 - 5-12

Методические рекомендации по профилактике рака молочной железы. ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И ПЕРИНАТОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.И. КУЛАКОВА» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

Институт онкогинекологии и маммологии

Общероссийская общественная организация «Российское общество специалистов по профилактике и лечению опухолей репродуктивной системы», 2018 год, стр 10

Лучевые методы диагностики.

Ультразвуковое исследование молочных желез.

Проводится на 5-12 день менструального цикла, дополняет и уточняет картину патологического процесса, полученного при других методах исследования. Для исследования отсутствуют возрастные ограничения и радиационная нагрузка.

2. Диагноз

Вопрос 4.

Учитывая жалобы, анамнез и данные обследования, пациентке следует поставить диагноз

1. Тубулярная деформация молочных желез 1 типа

2. Тубулярная деформация молочных желез 2 типа
3. Постлактационная инволюция молочных желез
4. Гипертрофия молочных желез

Правильный ответ:

4 - Гипертрофия молочных желез

Данный диагноз установлен на основании:

Жалоб пациента – На неудовлетворительную форму и провисание, большой объём и асимметрию молочных желез, боли в грудном отделе позвоночника, перетяжки от лямок бюстгалтера, повышенную потливость в области подгрудных складок, эстетический дискомфорт.

Анамнеза заболевания –

* Молочные железы начали постепенно увеличиваться в пубертате, бурно стали увеличиваться во время беременности. К концу беременности в железы еще больше увеличились и опустились. В связи с бурным увеличением молочных желез после родоразрешения и сложностями со сцеживанием и грудным вскармливанием, выполнено медикаментозное подавление лактации. Далее в течение 2—3 мес. молочные железы несколько уменьшились в объеме, но кожные покровы не сократились.

Клинического, лабораторного и инструментального обследования

- * параметры гипертрофированных и атрофированных молочных желез;
- * Строение молочной железы: смешанное с преобладанием жировой ткани. Протоки: соответствуют фазе менструального цикла, диффузные изменения нет, очаговые образований нет, млечные протоки (узи молочных желез): аксиллярные лимфоузлы не изменены. Эхокардиографическая картина соответствует фазе менструального цикла: УЗИ-признаки жировой трансформации молочных желез
- * Гормональный статус пациента: в пределах нормы для обозначенного возраста;
- * Признаков аденомы гипофиза, влекущие за собой постоянный рост ткани молочной железы не выявлен;
- * Отсутствие данных за другие диагнозы;

Вопрос 5.

При сборе фотодокументации перед операцией, помимо стандартных проекций, необходимо выполнить фотографирование

1. анфас и профиль с наклоном вперед, анфас с поднятыми руками
2. полупрофиль и профиль с поднятыми руками
3. анфас, полупрофиль и профиль в положении сидя и в положении руки на талии
4. анфас в положении лежа

Правильный ответ:

1 - анфас и профиль с наклоном вперед, анфас с поднятыми руками

Соколов И.С., Пшениснов К.П. «Протоколы подготовки и обеспечения основных эстетических операций». Избранные вопросы пластической хирургии. – Издательство «Аверс Плюс» г. Ярославль. – Издание под патронажем РНИМУ им. Н.И.Пирогова (Москва) и Ярославского государственного медицинского университета. - том 2 №2, 2018. – 40 стр_

Операции в области молочных желез. Увеличение молочных желез, редукция, подтяжка. В день операции – стр. 21.

* Фотографирование пациента в стандартных проекциях: две в профиль обычные и две с наклоном вперед с провисанием груди, две анфас с поднятыми и опущенными руками, а также

с наклоном вперед с провисанием груди, две в $\frac{3}{4}$ от подбородка до пупка

3. Лечение

Вопрос 6.

Оптимальным вариантом хирургической коррекции является

1. редукционная маммопластика с транспортом САК на питающей ножке
2. липосакция молочных желез с иссечением избытка кожи по периметру ареолы (периареолярно)
3. периареолярная мастопексия
4. редукционная маммопластика по Тореку

Правильный ответ:

1 - редукционная маммопластика с транспортом САК на питающей ножке

Учитывая возраст пациентки, необходимо попытаться сохранить для нее способность к лактации. Редукционная маммопластика по Тореку с переносом сосково-ареолярного комплекса в виде свободного кожного трансплантата лишит пациентку этой возможности.

Периареолярная мастопексия без редукции стромально-железистого компонента молочных желез при таком объеме не будет эффективна, а приведет к образованию широких рубцов и неудовлетворительной форме молочных желез. Липосакция не показана в данном случае.

Боровиков А.М. «Птоз молочных желез». Избранные вопросы пластической хирургии. – Издательство «Аверс Плюс» г. Ярославль. – Издание под патронажем Ярославской государственной медицинской академии. – том 1 №12, 2005. – 72 стр._

Вопрос 7.

Учитывая клиническую ситуацию, оптимальный для транспорта сосково-ареолярного комплекса является _____ питающая ножка

1. верхнее-медиальная
2. нижне-медиальная
3. верхняя
4. центральная

Правильный ответ:

1 - верхнее-медиальная

Боровиков А.М. «Птоз молочных желез». Избранные вопросы пластической хирургии. – Издательство «Аверс Плюс» г. Ярославль. – Издание под патронажем Ярославской государственной медицинской академии. – том 1 №12, 2005. – 72 стр._

Глава 5. Варианты ножек сосково-ареолярного комплекса – стр. 27

Рис. 19-21 показывают разнообразие ориентации ножки относительно САК – снизу, сверху, медиально, латерально или в сочетаниях.

Но чем длиннее ножка, тем в большей степени лоскут нуждается в осевом кровоснабжении.

Вопрос 8.

Раскрой при резекции кожного «чехла» и результирующий рубец в данном случае следует планировать

1. горизонтальный
2. периареолярный
3. циркумвертикальный

4 в виде инвертированной буквы Т

Правильный ответ:

4 - в виде инвертированной буквы Т

После редукционной маммопластики с переносом САК послеоперационный шов называется инвертированным Т

Боровиков А.М.. «Птоз молочных желез». Избранные вопросы пластической хирургии. – Издательство «Аверс Плюс» г. Ярославль. – Издание под патронажем Ярославской государственной медицинской академии. – том 1 №12, 2005. – 72 стр.

Глава 6. Варианты резекции кожного чехла при мастопексии – стр. 30-44

Вопрос 9.

Главным условием для транспорта САК с надежной васкуляризацией является

1. нижнее основание ножки
2. сохранение субдермально-паренхиматозных коллатералей в зоне САК
- 3 толщина слоя подлежащих тканей в зоне САК не менее 2 см
4. отношение длины питающей ножки к ее ширине не более 1:2

Правильный ответ:

3 - толщина слоя подлежащих тканей в зоне САК не менее 2 см

Толщина слоя подлежащих тканей в зоне САК (сосково-ареолярный комплекс) должна быть не менее 2 см для сохранения достаточного кровообращения

Боровиков А.М.. «Птоз молочных желез». Избранные вопросы пластической хирургии. – Издательство «Аверс Плюс» г. Ярославль. – Издание под патронажем Ярославской государственной медицинской академии. – том 1 №12, 2005. – 72 стр.

Глава 5. Варианты ножек сосково-ареолярного комплекса – стр 24-29

Вопрос 10.

Наиболее вероятным местным осложнением для данного типа операций является

1. развитие фиброзно-кистозной мастопатии
- 2 ишемия сосково-ареолярного комплекса
3. лимфостаз верхних конечностей
4. рецидив гипертрофии молочных желез

Правильный ответ:

2 - ишемия сосково-ареолярного комплекса

Соколов И.С., Пшениснов К.П. «Протоколы подготовки и обеспечения основных эстетических операций». Избранные вопросы пластической хирургии. – Издательство «Аверс Плюс» г. Ярославль. – Издание под патронажем РНИМУ им. Н.И.Пирогова (Москва) и Ярославского государственного медицинского университета. – том 2 №2, 2018. – 40 стр.

Операции в области молочных желез. Увеличение молочных желез, редукция, подтяжка. Настооженность – стр 25.

* Потемнение кожи по краям разрезов, замедление скорости сосудистого пятна, промокание повязки серозным отделяемым – признаки ишемии.

4. Вариатив

Вопрос 11.

В качестве профилактической противорубцовой терапии при отсутствии склонности к гипертрофическому рубцеванию в анамнезе пациентке следует назначить

1. Букки-терапию
2. применение силиконовых тейпов
3. магнитотерапию
4. местную гормонотерапию

Правильный ответ:
2 - применение силиконовых тейпов

Средством профилактики гипертрофических рубцов является использование силиконовых тейпов в домашних условиях

Федеральные клинические рекомендации по ведению больных с келоидными и гипертрофическими рубцами. Российское Общество Дерматовенерологов и Косметологов
Москва, 2015. Лечение

Вопрос 12.

Частота планового ультразвукового исследования в отдаленном послеоперационном периоде у данной пациентки – 1 раз в

1. 5 лет
2. год
3. 2 года
4. 6 месяцев

Правильный ответ:
2 - год

Методические рекомендации по совершенствованию организации медицинской помощи при заболеваниях молочной железы. Приложение к приказу Минздрава РФ №154 от 15.03.2006 «О мерах совершенствования медицинской помощи при заболеваниях молочных желез» (12 стр)

Система обследования молочных желез женщин (стр 10)

Рекомендовано ежегодное обследование молочных желез