



Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 05:02 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 05:00 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ДЛЯ МОЛОДОГО ПАЦИЕНТА С СИНДРОМОМ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЙ ДИСПЛАЗИИ (СИНДРОМ МАРФАНА) И НАЛИЧИЕМ ТОРАКОАБДОМИНАЛЬНОЙ АНЕВРИЗМЫ БОЛЕЕ 60 ММ В ДИАМЕТРЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

1. эндопротезирование аорты с выполнением при необходимости дебринга
2. наружное бандажирование расширенных участков аорты
3. медикаментозная терапия
4. протезирование всей нисходящей аорты с реплантацией ветвей

Правильный ответ: 4 - протезирование всей нисходящей аорты с реплантацией ветвей

Вопрос 2

АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ЯВЛЯЕТСЯ

1. внутричерепное кровоизлияние
2. более 6 баллов по шкале NIHSS
3. ишемический инсульт в анамнезе
4. срок заболевания более 3 часов

Правильный ответ: 1 - внутричерепное кровоизлияние

Вопрос 3

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИ КОАРКТАЦИИ АОРТЫ У ВЗРОСЛЫХ НАБЛЮДАЕТСЯ

1. расслоение дуги аорты
2. аневризма восходящего отдела аорты
3. бычья дуга
4. артерия Люзория

Правильный ответ: 2 - аневризма восходящего отдела аорты

Вопрос 4

АБСОЛЮТНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К ОПЕРАЦИИ TIPS ЯВЛЯЕТСЯ

1. «мост» перед пересадкой печени у больных с циррозом
2. повышение общего билирубина в 5 раз
3. профузное кровотечение из вен пищевода
4. первичная профилактика пищеводного (желудочного) кровотечения

Правильный ответ: 3 - профузное кровотечение из вен пищевода

Вопрос 5

ОДНОСТЕНТОВОЙ МЕТОДИКОЙ БИФУРКАЦИОННОГО СТЕНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1. DK-crush
2. TAP

3 Provisional

4. Culotte

Правильный ответ: 3 - Provisional

Вопрос 6

ЭМБОЛИЗАЦИЯ ПОЯСНИЧНЫХ АРТЕРИЙ ОБОСНОВАНА ПРИ НАЛИЧИИ ЭНДОЛИКА _____ ТИПА

1. I
2. V
3. III
- 4. II**

Правильный ответ: 4 - II

Вопрос 7

У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST ВЫПОЛНЕНИЕ КОРОНАРОГРАФИИ В ПЕРВЫЕ 24 ЧАСА ПОКАЗАНО В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ РИСК, ОЦЕНЕННЫЙ ПО ШКАЛЕ GRACE, СОСТАВЛЯЕТ ____ БАЛЛОВ

1. от 109 до 140
2. от 80 до 109
- 3. более 140**
4. менее 80

Правильный ответ: 3 - более 140

Вопрос 8

ОТМЕНА ВАРФАРИНА ПОСЛЕ ОККЛЮЗИИ УШКА ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ ВОЗМОЖНА _____

1. если имеются затеки по периферии окклюдера не более 10 мм
- 2. если отсутствуют затеки по периферии окклюдера**
3. если имеются затеки по периферии окклюдера 5-10 мм
4. через 1 месяц после операции

Правильный ответ: 2 - если отсутствуют затеки по периферии окклюдера

Вопрос 9

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ЭМБОЛИЗАЦИИ АРТЕРИЙ ПРИ ОПУХОЛЕВЫХ ПОРАЖЕНИЯХ КОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1. профилактика массивного интраоперационного кровотечения**
2. радикальное лечение опухоли
3. профилактика остеомиелита
4. профилактика патологических переломов

Правильный ответ: 1 - профилактика массивного интраоперационного кровотечения

Вопрос 10

ВЕТЬ ТУПОГО КРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕТВЛЕНИЕМ

1. передней межжелудочковой артерии
- ② огибающей артерии
3. правой коронарной артерии
4. задней межжелудочковой артерии

Правильный ответ: 2 - огибающей артерии