



Ультразвуковая диагностика

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 06:03 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 05:57 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

К ОСНОВНЫМ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ДЕГЕНЕРАТИВНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ МЕНИСКОВ ОТНОСЯТ

- ☒ 1. неоднородность структуры и гиперэхогенные включения в мениске
2. наличие округлых анэхогенных структур с ровными четкими контурами и дистальным усилением эхосигнала, повреждается чаще наружный мениск
3. наличие выпота в области поврежденного мениска, деформацию мениска, с атипичным гипоэхогенным линейным участком
4. наличие незначительного выпота в области поврежденного мениска, мениск не деформирован, однако содержит петрификаты

Правильный ответ: 1 - неоднородность структуры и гиперэхогенные включения в мениске

Вопрос 2

ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЖЕНЩИНЫ ДО 25 ЛЕТ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ ВЫГЛЯДИТ В ВИДЕ

1. гиперэхогенного тяжа
2. нескольких рядов гипоэхогенных образований с четко дифференцируемой гиперэхогенной капсулой
- ☒ 3. тонкого гипоэхогенного тяжа, без дифференциации на отдельные структуры
4. одного ряда округлых гипоэхогенных структур в передних отделах молочной железы

Правильный ответ: 3 - тонкого гипоэхогенного тяжа, без дифференциации на отдельные структуры

Вопрос 3

АНГИОМИОЛИПОМА ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ ВИДНА В ВИДЕ

1. смешанного по эхогенности образования с дистальным псевдоусилением
2. анэхогенного образования без дистального усиления
- ☒ 3. гиперэхогенного солидного образования с четкими контура чаще в паренхиме
4. солидного образования неоднородной структуры с множественными некротическими полостями

Правильный ответ: 3 - гиперэхогенного солидного образования с четкими контура чаще в паренхиме

Вопрос 4

РАЗМЕРЫ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА В ПАРАСТЕРНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ В КОНЦЕ ДИАСТОЛЫ НА УРОВНЕ КОНЦОВ СТВОРОК МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА В НОРМЕ СОСТАВЛЯЮТ НЕ _____ ММ

1. более 46
- ☒ 2. более 56
3. менее 40
4. более 40

Правильный ответ: 2 - более 56

Вопрос 5

ПРИ СТЕНОЗЕ ПЛЕЧЕГОЛОВНОГО СТВОЛА ОТ 50% ДО 70% РАЗВИВАЕТСЯ

1. постоянный синдром подключично-позвоночного обкрадывания
2. латентный синдром подключично-позвоночного обкрадывания
3. синдром внутримозгового обкрадывания каротидной системой вертебрально-базилярной
4. переходный синдром подключично-позвоночного обкрадывания

Правильный ответ: 2 - латентный синдром подключично-позвоночного обкрадывания

Вопрос 6

АДЕНОМАТОЗНЫЙ УЗЕЛ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ

1. всегда содержит кистозные полости
2. может иметь сниженную, среднюю или смешанную эхогенность
3. является анэхогенным
4. всегда сливается с изображением периферической части

Правильный ответ: 2 - может иметь сниженную, среднюю или смешанную эхогенность

Вопрос 7

ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ С ПОРАЖЕНИЕМ ТРИКУСПИДАЛЬНОГО КЛАПАНА РАЗВИВАЕТСЯ

1. стеноз трикуспидального клапана
2. регургитация трикуспидального клапана
3. тромбоз трикуспидального клапана
4. комбинированный порок трикуспидального клапана

Правильный ответ: 2 - регургитация трикуспидального клапана

Вопрос 8

РАЗМЕРЫ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА В БАЗАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЮТ (В ММ)

1. 42-43
2. 25-41
3. 44-45
4. 20-24

Правильный ответ: 2 - 25-41

Вопрос 9

ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СНИЖЕНИЕ РЕЙТИНГА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ РОСТ

1. впервые выявленных заболеваний
2. заболеваемости с временной утратой трудоспособности
3. количества обоснованных жалоб
4. числа пролеченных больных

Правильный ответ: 3 - количества обоснованных жалоб

Вопрос 10

МЕТАСТАЗЫ ПРИ ОПУХОЛИ ЯИЧКА СЛЕДУЕТ ИСКАТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО В

1. поджелудочной железе
2. надпочечниках
3. предстательной железе
4. забрюшинных лимфоузлах

Правильный ответ: 4 - забрюшинных лимфоузлах