



Управление сестринской деятельностью (маг)

Высшее образование

DOCX · PDF

Задач: 1

Вопросов: 12

Сформировано: 26.09.2026, 02:06 МСК · База обновлена: 19.09.2026, 17:25 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Ситуационная задача 0002

Образование: Высшее образование | Специальность: Управление сестринской деятельностью (маг)

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Главная медицинская сестра ГБУЗ «Городская поликлиника» в рамках оценки внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности проводит проверку деятельности медицинского персонала кабинета вакцинопрофилактики для оценки качества организации иммунопрофилактики.

В рамках проверки были отмечено, что медицинская сестра не может ответить на вопросы родителей и путает даты вакцинации и ревакцинации от распространенных «детских» инфекционных заболеваний.

Отмечены ошибки в расположении оснащения – холодильник с хранящимися в нем вакцинами плотно прижат к стене, а «холодовая цепь» контролируется с помощью ртутного термометра.

Медсестра-вакцинатор принимала пациентов без медицинской шапочки. Отмечен факт хранения вакцины в дверце холодильника.

Во флаконе с вакцинами медицинская сестра оставила иглу, чтобы набирать дозу следующим пациентам.

Ребенку, которому нужно было в этот день провести две процедуры вакцинации, медсестра набрала вакцину поочередно в один шприц. Кроме того, использовались разные вакцины и растворители для их разведения, набирались они из неполных флаконов.

Было установлено, что из-за нехватки персонала медицинская сестра была переведена из педиатрического отделения в кабинет вакцинопрофилактики.

1. Управление медицинской организацией

Вопрос 1.

Медицинский персонал должен осуществлять иммунизацию в

1. специальной медицинской одежде
2. специальной медицинской одежде (халате и шапочке) и нестерильных диагностических перчатках
3. нестерильных диагностических перчатках
4. стерильных диагностических перчатках

Правильный ответ:

2 - специальной медицинской одежде (халате и шапочке) и нестерильных диагностических перчатках

"4243. Медицинский персонал должен осуществлять иммунизацию в специальной медицинской одежде (халате и шапочке) и нестерильных диагностических перчатках. Перчатки необходимо менять после каждого пациента. Гигиеническая обработка рук медицинского персонала проводится в соответствии с требованиями Санитарных правил."

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

Вопрос 2.

Для объективного контроля температурного режима «холодовой цепи» используют

1. электронные термометры
2. газовые анализаторы
3. термоиндикаторы
4. ртутные градусники

Правильный ответ:
3 - термоиндикаторы

"4266. В системе «холодовой цепи» для транспортирования ИЛП используется следующее оборудование:термоконтейнеры"

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

Вопрос 3.

Вакцинацию осуществляют медицинские работники,

1. имеющие базовое среднее профессиональное образование
2. обученные правилам организации и техники проведения прививок, а также приемам неотложной помощи
3. прошедшие обучение в виде повышения квалификации по специальности «Лечебное дело»
4. имеющие обучение в виде повышения квалификации по специальности «Сестринское дело»

Правильный ответ:
2 - обученные правилам организации и техники проведения прививок, а также приемам неотложной помощи

"4204. Профилактические прививки проводят медицинские работники, обученные правилам организации и техники проведения прививок, а также приемам неотложной помощи в случае возникновения побочных проявлений после иммунизации и имеющие документальное подтверждение прохождения обучения"

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

Вопрос 4.

Введение вакцин (кроме вакцин для профилактики туберкулеза), применяемых в рамках национального календаря профилактических прививок, в один день

1. допускается разными шприцами в один участок тела
2. допускается одним шприцем в одно и то же место
3. категорически не допускается
4. допускается разными шприцами в разные участки тела

Правильный ответ:
4 - допускается разными шприцами в разные участки тела

Согласно Приказа Минздрава России от 06.12.2021 г. №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2021г.№66435),

«Национальный календарь прививок, таблица.»

"8. При изменении сроков вакцинации ее проводят по схемам, предусмотренным национальным календарем профилактических прививок, утвержденным настоящим приказом, настоящим порядком, и в соответствии с инструкциями по применению иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики. Допускается введение вакцин (за исключением вакцин для профилактики туберкулеза), применяемых в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в один день разными шприцами в разные участки тела."

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок"

(1)

Вопрос 5.

Интервал между первой и второй прививками против кори должен составлять не менее

- 1.** 3 месяцев
- 2. 2 недели
- 3. 60 суток
- 4. 30 дней

Правильный ответ:
1 - 3 месяцев

Согласно Приказа Минздрава России от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2021г. № 66435),

«Национальный календарь прививок, таблица.»

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок"

(1)

Вопрос 6.

Вакцинация против вирусного гепатита В проводится по схеме

- 1.** 0-1-6
- 2. 0-3-6
- 3. 0-1-9
- 4. 0-6-12

Правильный ответ:
1 - 0-1-6

Согласно Приказа Минздрава России от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2021г. № 66435),

«Национальный календарь прививок, таблица.»

"11. Вакцинация против вирусного гепатита В детей первого года жизни проводится по схеме 0-1-6 (1-я доза - в момент начала вакцинации, 2-я доза - через месяц после 1-й прививки, 3-я доза - через 6 месяцев от начала вакцинации). +

Вакцинация против вирусного гепатита В детей, относящихся к группам риска (родившимся от

матерей - носителей HBsAg, больных вирусным гепатитом В или перенесших вирусный гепатит В в третьем триместре беременности, не имеющих результатов обследования на маркеры гепатита В, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества, из семей, в которых есть носитель HBsAg или больной острым вирусным гепатитом В и хроническими вирусными гепатитами), проводится по схеме 0-1-2-12 (1-я доза - в момент начала вакцинации, 2-я доза - через месяц после 1-й прививки, 3-я доза - через 2 месяца от начала вакцинации, 4-я доза - через 12 месяцев от начала вакцинации)."

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок"

(1)

(2)

Вопрос 7.

Вакцинация против туберкулеза проводится новорожденным

1. в 1-2 день жизни
2. на 8-10 день жизни
- 3 на 3-7 день жизни
4. в 1 месяц

Правильный ответ:

3 - на 3-7 день жизни

Согласно Приказа Минздрава России от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2021г. № 66435),

«Национальный календарь прививок, таблица.»

"10. Вакцинация против туберкулеза проводится новорожденным на 3-7 день жизни вакциной для профилактики туберкулеза для щадящей первичной вакцинации (БЦЖ-М); в субъектах Российской Федерации с показателями заболеваемости, превышающими 80 на 100 тысяч населения, а также при наличии в окружении новорожденного больных туберкулезом - вакциной для профилактики туберкулеза (БЦЖ). Ревакцинация детям в 6-7 лет проводится вакциной для профилактики туберкулеза (БЦЖ). При отсутствии вакцинации против туберкулеза в родильном доме она может быть проведена в возрасте до 7 лет туберкулино-отрицательным детям."

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок"

(1)

Вопрос 8.

Перед проведением прививки медицинский работник должен проверить

1. артериальное давление у пациента
2. номер пациента в очереди
- 3 наличие заключения врача о допуске к прививке
4. наличие сменной обуви у пациента

Правильный ответ:

3 - наличие заключения врача о допуске к прививке

«Перед проведением прививки вакцинователь: проверяет наличие заключения врача о допуске к прививке; сверяет наименование препарата на ампуле с назначением врача, проверяет маркировку, срок годности медицинских иммунобиологических препаратов, целостность ампулы; визуально оценивает качество препарата (путем встряхивания сорбированных вакцин и после растворения лиофилизированных вакцин).»

Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению: учебник / под ред. Н. А. Касимовской. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-7634-5, DOI: 10.33029/9704-7634-5-NMK-2023-1-304.

(1)

Вопрос 9.

Хранение медицинских иммунологических препаратов на дверной панели холодильника

1. допускается
2. возможно
3. запрещается
4. не регламентировано

Правильный ответ:
3 - запрещается

Хранение МИБП на дверной панели холодильника не допускается.

Справочник главной медицинской сестры / под ред. С. И. Двойникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-5772-6

(1)

Вопрос 10.

Смешивать вакцины и растворители из неполных открытых флаконов

1. не допускается
2. разрешено во время карантина
3. допускается для рационализации деятельности
4. возможно при наличии большого количества пациентов

Правильный ответ:
1 - не допускается

"4225. Не допускается смешивание вакцин и растворителей из неполных открытых флаконов."

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

Вопрос 11.

Оставлять иглу в крышке флакона для взятия последующих доз вакцины

1. допускается для рационализации деятельности
2. возможно при наличии большого количества пациентов
3. запрещено
4. разрешено во время карантина

Правильный ответ:

3 - запрещено

"4233. Для забора каждой дозы вакцины из многодозового флакона используются стерильный шприц со стерильной иглой. Оставлять иглу в крышке флакона для взятия последующих доз вакцины запрещается. Для забора вакцины из флакона используется тот же шприц, который будет использован для инъекции"

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

Вопрос 12.

По результатам плановой проверки деятельности медицинского персонала кабинетов вакцинопрофилактики в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности главная медицинская сестра вносит предложения по устранению выявленных нарушений, в т.ч. по

1. выработке плана развития медицинской организации
2. информированию органов Роспотребнадзора выявленных нарушениях
3. передаче материалов проверки в прокуратуру
4. наложению дисциплинарного взыскания на медицинскую сестру кабинета вакцинопрофилактики

Правильный ответ:

4 - наложению дисциплинарного взыскания на медицинскую сестру кабинета вакцинопрофилактики

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

- 1) замечание;
- 2) выговор;
- 3) увольнение по соответствующим основаниям.

Организация и управление фармацевтической деятельностью : учебное пособие / под ред. И. А. Наркевича. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-7175-3

(1)