



Управление сестринской деятельностью (маг)

Высшее образование

DOCX · PDF

Задач: 2

Вопросов: 24

Сформировано: 26.09.2026, 02:06 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 02:01 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Содержание

Ситуационная задача 0001

Ситуационная задача 0002

Ситуационная задача 0001

Образование: Высшее образование | Специальность: Управление сестринской деятельностью (маг)

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Главная медицинская сестра ГБУЗ "Детская городская поликлиника № 99" при проведении внутреннего контроля качества, безопасности медицинской деятельности и оценки качества организации иммунопрофилактики отметила следующие факты:

- * температура в холодильнике с вакцинами измеряется раз в три дня;
- * в холодильнике имеется запас медицинских иммунобиологических препаратов, превышающий месячный;

Медицинской сестре было поручено транспортировать вакцины в другой филиал, для чего она упаковала ампулы с вакцинами в пластиковый пакет.

Подготовка шприцев и оснащения к проведению вакцинации проводилась над раковиной и на подоконнике. На многодозовых флаконах в холодильнике отмечена вчерашняя дата вскрытия.

Генеральная уборка холодильника, по данным записи журнала, проводится один раз в месяц.

Медицинская сестра кабинета иммунопрофилактики заранее набрала несколько шприцев с вакциной и поместила их на стерильном столике, так как к ней на прием были записаны несколько человек подряд по времени. Вакцинация была начата сразу после уточнения фамилии пациента.

1. Управление медицинской организацией

Вопрос 1.

Все манипуляции с вакцинами проводятся на(в)

1. лотках, расположенных на письменном столе
2. подоконнике кабинета иммунопрофилактики
3. специально промаркированных столах
4. кушетке, стоящей в кабинете

Правильный ответ:

3 - специально промаркированных столах

«Все манипуляции с вакцинами проводятся только на специально отведенном столе (столах)»

Эпидемиология: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Н.И. Брико, Л.П. Зуева, В.И. Покровский, В.П. Сергиев, В.В. Шкарин. — М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2013. — 832 с.: ил.

(1)

Вопрос 2.

Иммунизацию в медицинских организациях проводят в

1. кабинете старшей медицинской сестры
2. процедурном кабинете
3. специально оборудованных прививочных кабинетах
4. свободном/не занятом кабинете

Правильный ответ:

3 - специально оборудованных прививочных кабинетах

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

«4213. Профилактические прививки проводятся в прививочных кабинетах медицинских организаций, не допускается проведение прививок в процедурных кабинетах за исключением сельских медицинских организаций (фельдшерско-акушерских пунктов), в которых устанавливается график проведения процедур и иммунизации населения, исключающий одновременное их проведение, и предусматривающий обязательную влажную уборку помещения с применением дезинфицирующих средств и обеззараживанием воздуха после проведения процедур до начала иммунизации»

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

Вопрос 3.

Заблаговременный набор вакцины в шприцы и последующее хранение вакцины в шприцах

- 1** не допускается категорически
- 2. возможно при наличии большого количества пациентов
- 3. допускается для рационализации деятельности
- 4. разрешено во время карантина

Правильный ответ:

1 - не допускается категорически

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

«4227. Не разрешается заблаговременный набор вакцины в шприцы и последующее хранение вакцины в шприцах»

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

Вопрос 4.

Открытые флаконы с вакциной в конце рабочего дня

- 1** уничтожают в соответствии с установленными требованиями
- 2. оставляют на манипуляционном столике
- 3. ставят в стеклянный шкаф
- 4. помещают в холодильник для дальнейшего использования

Правильный ответ:

1 - уничтожают в соответствии с установленными требованиями

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

«4224. Открытые флаконы с вакциной в конце рабочего дня уничтожают в соответствии с обязательными требованиями»

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

Вопрос 5.

Вакцина из многодозных флаконов используется в течение

1. недели
2. рабочего дня
3. 15 минут
4. трех часов

Правильный ответ:
2 - рабочего дня

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

«4223. Вакцина из многодозных флаконов может использоваться в течение рабочего дня в соответствии с инструкцией по ее применению при соблюдении следующих условий:

- * забор каждой дозы вакцины из флакона осуществляется с соблюдением правил асептики;
- * вакцины хранятся при соответствующей температуре (от +2°C до +8°C);
- * восстановленные вакцины используются немедленно и хранению не подлежат..»

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

Вопрос 6.

Максимальный срок хранения медицинских иммунобиологических препаратов в медицинских организациях, где проводятся профилактические прививки, составляет

1. 1 месяц
2. 2 недели
3. 10 дней
4. 3 дня

Правильный ответ:
1 - 1 месяц

«Максимальный срок хранения вакцин в учреждениях, где проводят профилактические прививки, составляет 1 мес. В труднодоступных районах данный срок хранения может быть увеличен до 3 мес.»

Эпидемиология: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Н.И. Брико, Л.П. Зуева, В.И. Покровский, В.П. Сергиев, В.В. Шкарин. — М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2013. — 832 с.: ил.

(1)

Вопрос 7.

Перед проведением прививки медицинская сестра-вакцинатор должна проверить

1. наличие заключения врача о допуске к прививке
2. номер пациента в очереди
3. артериальное давление у пациента

4. наличие сменной обуви у пациента

Правильный ответ:

1 - наличие заключения врача о допуске к прививке

«Перед проведением прививки вакцинатор:

- * проверяет наличие заключения врача о допуске к прививке;
- * сверяет наименование препарата на ампуле с назначением врача, проверяет маркировку, срок годности медицинских иммунобиологических препаратов, целостность ампулы;
- * визуально оценивает качество препарата (путем встряхивания сорбированных вакцин и после растворения лиофилизированных вакцин).»

Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению: учебник / под ред. Н. А. Касимовской. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-7634-5, DOI: 10.33029/9704-7634-5-NMK-2023-1-304.

(1)

Вопрос 8.

Температура в холодильнике, где хранятся вакцины измеряется ____ раз(-а) в день

1. 3
2. 4
- 3. 2**
4. 1

Правильный ответ:

3 - 2

«Температурный режим хранения вакцин в холодильнике контролируют дважды в сутки. Показания термометра заносят в журнал регистрации температурного режима холодильника. В процессе хранения препаратов следует проводить их выборочный визуальный контроль не реже 1 раза в месяц. При аварийном или плановом (на мойку) отключении холодильника вакцины следует хранить в термоконтейнерах с хладоэлементами. Аварийное или плановое отключение холодильника фиксируют в журнале регистрации температурного режима холодильника»

Зверев, В. В. Вакцины и вакцинация: Национальное руководство. Краткое издание / под ред. В. В. Зверева, Р. М. Хаитова - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 640 с. - ISBN 978-5-9704-2866-5.

(1)

Вопрос 9.

Генеральная уборка холодильника для вакцин проводится ____ раз(а) в

1. 2; неделю
2. 3; полгода
3. 1; 15 дней
- 4. 1; месяц**

Правильный ответ:

4 - 1; месяц

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

"4310. Текущая уборка в холодильных камерах (комнатах) осуществляется по мере необходимости; генеральная уборка проводится не реже одного раза в месяц."

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

Вопрос 10.

Транспортирование медицинских иммунобиологических препаратов должно осуществляться при соблюдении температурного режима, для чего в каждый контейнер с вакциной вкладывают

1. ртутный термометр
2. инфракрасный термометр
3. электронный термометр
4. термоиндикатор

Правильный ответ:
4 - термоиндикатор

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

«Хранение и транспортирование иммунобиологических лекарственных препаратов, предназначенных для иммунизации населения, на всех этапах должно осуществляться с соблюдением температурных режимов хранения и транспортирования»

"4267. Для транспортирования обычным (не рефрижераторным) транспортом ИЛП упаковываются в специальные термоконтейнеры, обеспечивающие соблюдение требуемого интервала температур в течение всего времени транспортирования с учетом сезонных колебаний температуры в конкретной климатической зоне."

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

Вопрос 11.

Лиофилизированная вакцина хранится в кабинете иммунопрофилактики на(в)

1. дверце холодильника
2. верхней полке холодильника
3. нижней полке шкафа в кабинете
4. сейфе кабинета

Правильный ответ:
2 - верхней полке холодильника

«Совместное хранение МИБП с другими медицинскими препаратами не допускается. Препараты одного наименования располагаются по сериям, с учетом срока годности. Вакцины разных наименований хранятся в одном холодильнике на разных маркированных полках. В морозильной камере хранят холодные элементы, заполняя камеру постепенно во избежание повышения температуры и располагая их в положении на боку так, чтобы между ними оставалось место для циркуляции воздуха. В холодильной камере на верхней полке лежат живые вирусные вакцины против полиомиелита и кори; на средней полке - неадсорбированные вакцины; на нижней полке - вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС) и другие неадсорбированные препараты, растворители; вакцину БЦЖ хранят в отдельном холодильнике на средней полке. Хранение МИБП на дверной панели холодильника не допускается. Выборочный визуальный контроль МИБП в процессе хранения осуществляется не реже чем 1

раз в месяц. Первоочередность использования вакцин определяется сроками годности».

Справочник главной медицинской сестры / под ред. С. И. Двойникова. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-5772-6

(1)

Вопрос 12.

По результатам плановой проверки деятельности медицинского персонала кабинетов вакцинопрофилактики в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности главная медицинская сестра составляет _____ и вносит предложения по устранению выявленных нарушений, в т.ч. по

- 1 отчет; наложению дисциплинарного взыскания на медицинскую сестру кабинета вакцинопрофилактики
2. протокол; передаче материалов проверки в прокуратуру
3. акт; информированию средств массовой информации о выявленных нарушениях
4. справку; выработке плана развития медицинской организации

Правильный ответ:

1 - отчет; наложению дисциплинарного взыскания на медицинскую сестру кабинета вакцинопрофилактики

Приказ от 31 июля 2020 г. № 785н "об утверждении требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности"

«20. По результатам плановых и целевых (внеплановых) проверок Комиссией (Службой) и (или) Уполномоченным лицом составляется отчет, включающий в том числе выработку мероприятий по устранению выявленных нарушений и улучшению деятельности медицинской организации и медицинских работников».

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ статья 192. Дисциплинарные взыскания:

«За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

- 1) замечание;
- 2) выговор;
- 3) увольнение по соответствующим основаниям».

ПРИКАЗ от 31 июля 2020 г. N 785н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

(1)

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024)

(1)

Ситуационная задача 0002

Образование: Высшее образование | Специальность: Управление сестринской деятельностью (маг)

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Главная медицинская сестра ГБУЗ «Городская поликлиника» в рамках оценки внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности проводит проверку деятельности медицинского персонала кабинета вакцинопрофилактики для оценки качества организации иммунопрофилактики.

В рамках проверки были отмечено, что медицинская сестра не может ответить на вопросы родителей и путает даты вакцинации и ревакцинации от распространенных «детских» инфекционных заболеваний.

Отмечены ошибки в расположении оснащения – холодильник с хранящимися в нем вакцинами плотно прижат к стене, а «холодовая цепь» контролируется с помощью ртутного термометра.

Медсестра-вакцинатор принимала пациентов без медицинской шапочки. Отмечен факт хранения вакцины в дверце холодильника.

Во флаконе с вакцинами медицинская сестра оставила иглу, чтобы набирать дозу следующим пациентам.

Ребенку, которому нужно было в этот день провести две процедуры вакцинации, медсестра набрала вакцину поочередно в один шприц. Кроме того, использовались разные вакцины и растворители для их разведения, набирались они из неполных флаконов.

Было установлено, что из-за нехватки персонала медицинская сестра была переведена из педиатрического отделения в кабинет вакцинопрофилактики.

1. Управление медицинской организацией

Вопрос 1.

Медицинский персонал должен осуществлять иммунизацию в

1. специальной медицинской одежде
2. специальной медицинской одежде (халате и шапочке) и нестерильных диагностических перчатках
3. нестерильных диагностических перчатках
4. стерильных диагностических перчатках

Правильный ответ:

2 - специальной медицинской одежде (халате и шапочке) и нестерильных диагностических перчатках

"4243. Медицинский персонал должен осуществлять иммунизацию в специальной медицинской одежде (халате и шапочке) и нестерильных диагностических перчатках. Перчатки необходимо менять после каждого пациента. Гигиеническая обработка рук медицинского персонала проводится в соответствии с требованиями Санитарных правил."

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

Вопрос 2.

Для объективного контроля температурного режима «холодовой цепи» используют

1. электронные термометры
2. газовые анализаторы
3. термоиндикаторы
4. ртутные градусники

Правильный ответ:
3 - термоиндикаторы

"4266. В системе «холодовой цепи» для транспортирования ИЛП используется следующее оборудование:термоконтейнеры"

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

Вопрос 3.

Вакцинацию осуществляют медицинские работники,

1. имеющие базовое среднее профессиональное образование
2. обученные правилам организации и техники проведения прививок, а также приемам неотложной помощи
3. прошедшие обучение в виде повышения квалификации по специальности «Лечебное дело»
4. имеющие обучение в виде повышения квалификации по специальности «Сестринское дело»

Правильный ответ:
2 - обученные правилам организации и техники проведения прививок, а также приемам неотложной помощи

"4204. Профилактические прививки проводят медицинские работники, обученные правилам организации и техники проведения прививок, а также приемам неотложной помощи в случае возникновения побочных проявлений после иммунизации и имеющие документальное подтверждение прохождения обучения"

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

Вопрос 4.

Введение вакцин (кроме вакцин для профилактики туберкулеза), применяемых в рамках национального календаря профилактических прививок, в один день

1. допускается разными шприцами в один участок тела
2. допускается одним шприцем в одно и то же место
3. категорически не допускается
4. допускается разными шприцами в разные участки тела

Правильный ответ:
4 - допускается разными шприцами в разные участки тела

Согласно Приказа Минздрава России от 06.12.2021 г. №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2021г.№66435),

«Национальный календарь прививок, таблица.»

"8. При изменении сроков вакцинации ее проводят по схемам, предусмотренным национальным календарем профилактических прививок, утвержденным настоящим приказом, настоящим порядком, и в соответствии с инструкциями по применению иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики. Допускается введение вакцин (за исключением вакцин для профилактики туберкулеза), применяемых в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в один день разными шприцами в разные участки тела."

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок"

(1)

Вопрос 5.

Интервал между первой и второй прививками против кори должен составлять не менее

- 1.** 3 месяцев
- 2. 2 недели
- 3. 60 суток
- 4. 30 дней

Правильный ответ:
1 - 3 месяцев

Согласно Приказа Минздрава России от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2021г. № 66435),

«Национальный календарь прививок, таблица.»

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок"

(1)

Вопрос 6.

Вакцинация против вирусного гепатита В проводится по схеме

- 1.** 0-1-6
- 2. 0-3-6
- 3. 0-1-9
- 4. 0-6-12

Правильный ответ:
1 - 0-1-6

Согласно Приказа Минздрава России от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2021г. № 66435),

«Национальный календарь прививок, таблица.»

"11. Вакцинация против вирусного гепатита В детей первого года жизни проводится по схеме 0-1-6 (1-я доза - в момент начала вакцинации, 2-я доза - через месяц после 1-й прививки, 3-я доза - через 6 месяцев от начала вакцинации). +

Вакцинация против вирусного гепатита В детей, относящихся к группам риска (родившимся от

матерей - носителей HBsAg, больных вирусным гепатитом В или перенесших вирусный гепатит В в третьем триместре беременности, не имеющих результатов обследования на маркеры гепатита В, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества, из семей, в которых есть носитель HBsAg или больной острым вирусным гепатитом В и хроническими вирусными гепатитами), проводится по схеме 0-1-2-12 (1-я доза - в момент начала вакцинации, 2-я доза - через месяц после 1-й прививки, 3-я доза - через 2 месяца от начала вакцинации, 4-я доза - через 12 месяцев от начала вакцинации)."

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок"

(1)

(2)

Вопрос 7.

Вакцинация против туберкулеза проводится новорожденным

1. в 1-2 день жизни
2. на 8-10 день жизни
- 3 на 3-7 день жизни
4. в 1 месяц

Правильный ответ:

3 - на 3-7 день жизни

Согласно Приказа Минздрава России от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2021г. № 66435),

«Национальный календарь прививок, таблица.»

"10. Вакцинация против туберкулеза проводится новорожденным на 3-7 день жизни вакциной для профилактики туберкулеза для щадящей первичной вакцинации (БЦЖ-М); в субъектах Российской Федерации с показателями заболеваемости, превышающими 80 на 100 тысяч населения, а также при наличии в окружении новорожденного больных туберкулезом - вакциной для профилактики туберкулеза (БЦЖ). Ревакцинация детям в 6-7 лет проводится вакциной для профилактики туберкулеза (БЦЖ). При отсутствии вакцинации против туберкулеза в родильном доме она может быть проведена в возрасте до 7 лет туберкулино-отрицательным детям."

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок"

(1)

Вопрос 8.

Перед проведением прививки медицинский работник должен проверить

1. артериальное давление у пациента
2. номер пациента в очереди
- 3 наличие заключения врача о допуске к прививке
4. наличие сменной обуви у пациента

Правильный ответ:

3 - наличие заключения врача о допуске к прививке

«Перед проведением прививки вакцинатор: проверяет наличие заключения врача о допуске к прививке; сверяет наименование препарата на ампуле с назначением врача, проверяет маркировку, срок годности медицинских иммунобиологических препаратов, целостность ампулы; визуально оценивает качество препарата (путем встряхивания сорбированных вакцин и после растворения лиофилизированных вакцин).»

Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению: учебник / под ред. Н. А. Касимовской. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-7634-5, DOI: 10.33029/9704-7634-5-NMK-2023-1-304.

(1)

Вопрос 9.

Хранение медицинских иммунологических препаратов на дверной панели холодильника

1. допускается
2. возможно
3. запрещается
4. не регламентировано

Правильный ответ:
3 - запрещается

Хранение МИБП на дверной панели холодильника не допускается.

Справочник главной медицинской сестры / под ред. С. И. Двойникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 320 с. - ISBN 978-5-9704-5772-6

(1)

Вопрос 10.

Смешивать вакцины и растворители из неполных открытых флаконов

1. не допускается
2. разрешено во время карантина
3. допускается для рационализации деятельности
4. возможно при наличии большого количества пациентов

Правильный ответ:
1 - не допускается

"4225. Не допускается смешивание вакцин и растворителей из неполных открытых флаконов."

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

Вопрос 11.

Оставлять иглу в крышке флакона для взятия последующих доз вакцины

1. допускается для рационализации деятельности
2. возможно при наличии большого количества пациентов
3. запрещено
4. разрешено во время карантина

Правильный ответ:

3 - запрещено

"4233. Для забора каждой дозы вакцины из многодозового флакона используются стерильный шприц со стерильной иглой. Оставлять иглу в крышке флакона для взятия последующих доз вакцины запрещается. Для забора вакцины из флакона используется тот же шприц, который будет использован для инъекции"

Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации От 28.01.2021 №4

(1)

Вопрос 12.

По результатам плановой проверки деятельности медицинского персонала кабинетов вакцинопрофилактики в рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности главная медицинская сестра вносит предложения по устранению выявленных нарушений, в т.ч. по

1. выработке плана развития медицинской организации
2. информированию органов Роспотребнадзора выявленных нарушениях
3. передаче материалов проверки в прокуратуру
4. наложению дисциплинарного взыскания на медицинскую сестру кабинета вакцинопрофилактики

Правильный ответ:

4 - наложению дисциплинарного взыскания на медицинскую сестру кабинета вакцинопрофилактики

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

- 1) замечание;
- 2) выговор;
- 3) увольнение по соответствующим основаниям.

Организация и управление фармацевтической деятельностью : учебное пособие / под ред. И. А. Наркевича. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-7175-3

(1)