MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Анестезиология и реаниматология

Среднее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 04:30 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

НАРУШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ПОСЛЕ ПРЕМЕДИКАЦИИ ПРИ

1. введении аналгетиков
2. печеночной недостаточности
3. надпочечниковой недостаточности
4. **резком изменении положения пациента**

Правильный ответ: 4 - резком изменении положения пациента

Вопрос 2

ВОЗМОЖНЫЕ НАРУШЕНИЯ ДЫХАНИЯ ПОСЛЕ ПРЕМЕДИКАЦИИ

1. нарушение проходимости дыхательных путей вследствие бронхоспазма
2. продленное апноэ
3. развитие ателектаза
4. **гиповентиляция и гипоксия с гиперкапнией вследствие центрального угнетения дыхания**

Правильный ответ: 4 - гиповентиляция и гипоксия с гиперкапнией вследствие центрального угнетения дыхания

Вопрос 3

НАИБОЛЬШЕЙ АНАЛГЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОБЛАДАЕТ

1. пропофол
2. сомбревин
3. **кетамин**
4. гексенал

Правильный ответ: 3 - кетамин

Вопрос 4

В ПЛАН УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ ПОСЛЕ ИНТУБАЦИОННОГО НАРКОЗА МЕДСЕСТРА ВКЛЮЧИТ

1. **санацию верхних дыхательных путей**
2. кормление через зонд
3. обильное питье
4. сифонную клизму

Правильный ответ: 1 - санацию верхних дыхательных путей

Вопрос 5

У ПАЦИЕНТА ПЕРВАЯ ГРУППА КРОВИ, ЕСЛИ (ПРИ ПОМОЩИ СТАНДАРТНЫХ СЫВОРОТОК ЦОЛИПК)

1. агглютинация с обеими сыворотками
2. агглютинация наступила с сыворотками II группы и нет с сывороткой III группы
3. агглютинация наступила с сывороткой III группы и нет с сывороткой II группы
4. **агглютинации не наступило ни с одной из стандартных сывороток**

Правильный ответ: 4 - агглютинации не наступило ни с одной из стандартных сывороток

Вопрос 6

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО _____ ЧАСОВ

1. **24**
2. 36
3. 48
4. 56

Правильный ответ: 1 - 24

Вопрос 7

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕКУРАРИЗАЦИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО

1. при полной блокаде нервно-мышечной проводимости
2. через 20 минут при отсутствии спонтанной вентиляции
3. сразу же по окончании наркоза независимо от степенивосстановления спонтанного дыхания
4. **при неполном восстановлении нервно-мышечной проводимости и появлении самостоятельного дыхания**

Правильный ответ: 4 - при неполном восстановлении нервно-мышечной проводимости и появлении самостоятельного дыхания

Вопрос 8

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АППАРАТ

1. Короткова
2. Илизарова
3. **Вальдмана**
4. Джарвика

Правильный ответ: 3 - Вальдмана

Вопрос 9

НАИБОЛЕЕ ТЯЖЁЛАЯ ТРАНСФУЗИОННАЯ РЕАКЦИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

1. острой почечной недостаточности
2. **переливании крови иной группы**
3. нарушении свёртывающей системы крови больного
4. переливании крови сроком хранения 21 день

Правильный ответ: 2 - переливании крови иной группы

Вопрос 10

КИСЛОРОД, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ, УВЛАЖНЯЮТ

1. водой, подогретой до 60°С
2. 70% спиртом
3. **30% спиртом**
4. 40% раствором глюкозы

Правильный ответ: 3 - 30% спиртом