



Лечебное дело ПСА

Среднее образование

DOCX · PDF

Задач: 1

Вопросов: 12

Сформировано: 26.09.2026, 08:01 МСК · База обновлена: 19.09.2026, 08:28 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Ситуационная задача 0002

Образование: Среднее образование | Специальность: Лечебное дело ПСА

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Фельдшера вызвали на дом к женщине, 46 лет в связи с острым заболеванием.

1.2. Жалобы

На острую боль в правой поясничной области высокой интенсивности, с иррадиацией в правую паховую область, частое мочеиспускание, тошноту. Пациентка отмечает, что моча стала красного цвета.

1.3. Анамнез заболевания

Боль возникла внезапно, 20 минут назад. В течение двух лет периодически отмечала кратковременную режущую боль в правой поясничной области с иррадиацией по ходу мочеточника, эпизодически - резь в конце мочеиспускания. + Лечилась мочегонными травами, за медицинской помощью не обращалась. Ухудшение состояния связывает с интенсивной физической нагрузкой.

1.4. Анамнез жизни

Росла и развивалась соответственно возрасту. +
Профессия: бухгалтер. +
Перенесенные заболевания и операции: детские инфекции, Наследственность: у матери - ИБС, у отца - подагра. +
Гинекологический анамнез - беременности 2, роды 2, менопауза с 45 лет. +
Вредные привычки: отрицает. +
Аллергоанамнез: неотягощен. +
Ведет малоподвижный образ жизни, жидкости потребляет в день мало.

1.5. Объективный статус

Состояние средней степени тяжести, занимает вынужденное положение согнувшись, держит руку на правой поясничной области. Температура 36,7°C. Рост 170 см, масса тела 92 кг. ИМТ 31,8 кг/м². Кожные покровы лица бледные. Периферических отеков нет. Дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧДД 19 в 1 мин. Верхушечный толчок пальпируется на 1 см кнутри от левой срединно-ключичной линии в 5 межреберье, площадь 2 см². Границы относительной сердечной тупости; правая - в 4 межреберье по правому краю грудины, верхняя - по левой срединно-ключичной линии на уровне 3 ребра, левая - на 1 см кнутри от левой срединно-ключичной линии в 5 межреберье, совпадает с верхушечным толчком. Тоны ясные, ритм правильный, ЧСС 75 в 1 мин, АД 145/90 мм рт. ст. Пульс удовлетворительного наполнения и напряжения, ритмичный, 75 в минуту. Живот умеренно напряжен в правом фланке, отмечается болезненность при пальпации в проекции правой почки. Печень по краю реберной дуги. Симптом Пастернацкого положителен с правой стороны. Мочеиспускание частое, моча красного цвета

1. План обследования

Вопрос 1.

Необходимыми для постановки диагноза лабораторными методами обследования являются

1. определение уровня натрийуретического пептида
2. исследование кала на яйца гельминтов
- 3 биохимический анализ крови
- 4 общий (клинический) анализ мочи

5. исследование кала на скрытую кровь

6 общий (клинический) анализ крови

Правильные ответы:

3 - биохимический анализ крови

4 - общий (клинический) анализ мочи

6 - общий (клинический) анализ крови

Рекомендуется пациентам с почечной коликой выполнение биохимического анализа крови с определением концентрации креатинина, мочевины и электролитов (калий, натрий) в плазме крови с целью уточнения диагноза и исключения развития осложнений.

Клинические рекомендации Минздрава России. Почечная колика, 2024 г.

Диагностика

(1)

Рекомендуется пациентам с почечной коликой выполнение общего анализа мочи с целью уточнения диагноза и исключения развития осложнений.

Клинические рекомендации Минздрава России. Почечная колика, 2024 г.

Диагностика

(1)

Рекомендуется пациентам с почечной коликой выполнение клинического анализа крови для оценки активности воспалительного процесса.

Клинические рекомендации Минздрава России. Почечная колика, 2024 г.

Диагностика

(1)

Вопрос 2.

К необходимым для постановки диагноза инструментальным методам обследования относят

1. МРТ головного мозга

2. ЭГДС

3. регистрацию ЭКГ (12 отведений)

4 мультиспиральную компьютерную томографии почек и мочевыводящих путей без контрастного усиления

5. рентгенографию органов грудной клетки

Правильный ответ:

4 - мультиспиральную компьютерную томографии почек и мочевыводящих путей без контрастного усиления

Рекомендуется пациентам с подозрением на почечную колику выполнение мультиспиральной компьютерной томографии почек и мочевыводящих путей без контрастного усиления

Клинические рекомендации Минздрава России. Почечная колика, 2024 г.

Диагностика

(1)

2. Диагноз

Вопрос 3.

Учитывая жалобы, данные анамнеза, объективных методов обследования, больному можно поставить предварительный диагноз

- ☒ 1. Мочекаменная болезнь. Почечная колика
2. Острый правосторонний пиелонефрит
3. Острый тубулоинтерстициальный нефрит
4. Первичный хронический правосторонний пиелонефрит, фаза обострения

Правильный ответ:

1 - Мочекаменная болезнь. Почечная колика

Учитывая жалобы пациента, данные анамнеза заболевания (острая боль в правой поясничной области высокой интенсивности, с иррадиацией в правую паховую область, частое мочеиспускание, тошнота, периодически режущие боли в правой поясничной области в анамнезе, изменение цвета мочи), положительный симптом Пастернацкого справа, наличие конкремента в нижней трети правого мочеточника.

Диагноз устанавливается на основании сбора анамнеза, жалоб пациента, данных лабораторных и инструментальных исследований. Наиболее надежным критерием установки диагноза является визуализация конкрементов при помощи компьютерной томографии.

Клинические рекомендации Минздрава России. Почечная колика, 2024 г.

Диагностика

(1)

Вопрос 4.

Фактором риска развития мочекаменной болезни является

1. прием мочегонных трав
2. прием большого количества жидкости
3. высокая физическая активность
- ☒ 4. метаболический синдром

Правильный ответ:

4 - метаболический синдром

Метаболический синдром и другие нарушения обмена веществ повышают вероятность развития мочекаменной болезни.

Клинические рекомендации Минздрава России. Почечная колика, 2024 г.

Жалобы и анамнез

(1)

3. Лечение

Вопрос 5.

С целью обезболивания пациенту показано назначение

1. ацетилсалициловой кислоты
2. морфина
3. лоратадина

4 диклофенака

Правильный ответ:
4 - диклофенака

Пациентам с почечной коликой рекомендуется назначение нестероидных противовоспалительных препаратов (диклофенак, индометацин, ибупрофен**) с целью обезболивания

Клинические рекомендации Минздрава России. Почечная колика, 2024 г.

Лечение

(1)

Вопрос 6.

Диклофенак противопоказан пациентам с сопутствующим заболеванием

1. хронический тонзиллит
2. ХОБЛ
- 3 ишемическая болезнь сердца
4. хронический бронхит

Правильный ответ:
3 - ишемическая болезнь сердца

Диклофенак и ибупрофен повышают риск сердечно-сосудистых осложнений, противопоказаны пациентам с сердечно-сосудистой недостаточностью, ишемической болезнью сердца, заболеваниями периферических сосудов и цереброваскулярной патологией.

Клинические рекомендации Минздрава России. Почечная колика, 2024 г.

Лечение

(1)

Вопрос 7.

Консервативная терапия, направленная на самопроизвольное отхождение конкремента, рекомендована при его размере не более ___ мм

1. 13
2. 12
3. 11
- 4 7

Правильный ответ:
4 - 7

Рекомендуется пациентам с размером конкремента менее 7 мм и с контролируемым болевым синдромом проводить консервативную терапию, направленную на самопроизвольное отхождение конкремента.

Клинические рекомендации Минздрава России. Почечная колика, 2024 г.

Лечение

(1)

Вопрос 8.

С помощью перорального приема лекарственных препаратов могут быть растворены камни

- 1. ураты
- 2. кальцинаты
- 3. фосфаты
- 4. оксалаты

Правильный ответ:
1 - ураты

Рекомендуется проведение перорального хемолиза препаратами, содержащими цитрат калия или бикарбонат натрия из группы лекарственных средств для лечения уролитиаза у пациентов с камнями, состоящими из мочевой кислоты с целью их растворения

Клинические рекомендации Минздрава России. Мочекаменная болезнь, 2024 г.

Медикаментозное лечение

(1)

Вопрос 9.

Пациенту с почечной коликой, при невозможности назначения диклофенака для обезболивания, применяют

- 1. мебеверин
- 2. димедрол
- 3. метамизол натрия
- 4. дротаверин

Правильный ответ:
3 - метамизол натрия

Рекомендуется пациентам с почечной коликой и невозможностью назначения НПВС (в том числе из-за аллергических реакций) применение метамизола натрия с целью обезболивания в качестве альтернативы НПВС.

Клинические рекомендации Минздрава России. Почечная колика, 2024 г.

Лечение

(1)

Вопрос 10.

При неэффективности или невозможности назначения диклофенака и метамизола натрия, в качестве препаратов второй линии с целью обезболивания пациенту с почечной коликой применяют

- 1. мебеверин
- 2. димедрол
- 3. трамадол
- 4. дротаверин

Правильный ответ:
3 - трамадол

Рекомендуется пациентам с почечной коликой при неэффективности или невозможности назначения НПВС (в том числе из-за аллергических реакций) применение опиоидных анальгетиков (фентанил) и анальгетиков со смешанным механизмом действия (трамадол) в качестве препаратов второй линии с целью обезболивания.

Клинические рекомендации Минздрава России. Почечная колика, 2024 г.

Лечение

(1)

4. Вариатив

Вопрос 11.

Медикаментозная камнеизгоняющая терапия при размерах конкремента от 5 до 10 мм проводится препаратами группы

1. селективных альфа1-адреноблокаторов
2. бета-адреномиметиков
3. селективных бета-адреноблокаторов
4. альфа-адреномиметиков

Правильный ответ:

1 - селективных альфа1-адреноблокаторов

Рекомендуется пациентам с размером конкремента, превышающим 5 мм, и с хорошо контролируемой анальгезией назначать α -адреноблокаторы (#тамсулозин**, #алфузозин, #теразозин, #силодозин) в качестве медикаментозной камнеизгоняющей терапии.

Клинические рекомендации Минздрава России. Почечная колика, 2024 г.

Лечение

(1)

Вопрос 12.

Пациентам, относящимся к низкой группе риска по рецидиву МКБ, для профилактики заболевания рекомендуется ограничение потребления

1. жидкости
2. соли
3. фруктов
4. углеводов

Правильный ответ:

2 - соли

Пациентам, относящимся к низкой группе риска по рецидиву МКБ рекомендуется ограничение потребления соли до 3-5 грамм в сутки.

Клинические рекомендации Минздрава России. Мочекаменная болезнь, 2024 г.

Профилактика

(1)